

برونکوپنومونی در کودکان

پنومونی یکی از انواع عفونت های ریوی است و هنگامی رخ می دهد که ویروس ها، باکتری ها یا قارچ ها باعث ایجاد التهاب و عفونت در ریه ها شوند. اگر پنومونی باعث ایجاد التهاب در آلوئولها شود، به آن برونکوپنومونی گفته می شود.

افراد مبتلا به برونکوپنومونی دچار مشکلات تنفسی هستند زیرا مجاری هوایی آنها محدود شده است. علائم این وضعیت می تواند خفیف یا شدید باشد.

علائم برونکوپنومونی در بزرگسالان کودکان

علائم ممکن است مانند سایر انواع پنومونی باشد. این وضعیت اغلب با علائم شبه آنفولانزا آغاز می شود که می توانند طی چند روز شدید تر شوند. علائم این بیماری شامل موارد زیر است:

تب

سرفه ای که مخاط ایجاد می کند

تنگی نفس

درد قفسه سینه

تنفس سریع و پی در پی

تعریق

لرز

سردرد

درد های عضلانی

درد قفسه سینه که در اثر التهاب ناشی از سرفه زیاد

ایجاد می شود

خستگی

سردرگمی یا هذیان، به ویژه در افراد مسن

این علائم ممکن است به ویژه در افراد دارای

سیستم ایمنی ضعیف یا بیماری های دیگر جدی

باشد.

در نوزادان و خردسالان

نوزادان ممکن است علائم متفاوتی را نشان دهند. در حالی که سرفه شایع ترین علامت در نوزادان است، ممکن است موارد دیگری را نیز داشته باشند:

ضربان قلب سریع

سطح پایین اکسیژن خون

انقباض عضلات قفسه سینه

تحریک پذیری

کاهش علاقه به غذا خوردن یا نوشیدن

تب

دشواری در خوابیدن

درمان برونکوپنومونی

گزینه های درمان برونکوپنومونی شامل هر دو درمان در منزل و درمان های پزشکی می باشند.



شماره سند: EL-09-15

تاریخ صدور: 1403/01/15

تاریخ بازنگری: 1404/01/15

مرکز آموزشی درمانی ولایت

آموزش به بیمار

برونکوپنومونی



تایید شده توسط دکتر یوسفی

تهیه کننده: رابعه بینائیان

Vlayathouse.semums.ac.ir

مراقبت در منزل

نوع ویروسی معمولاً نیازی به درمان پزشکی ندارد، مگر اینکه شدید باشد. به طور معمول طی دو هفته بهبود می یابد. انواع باکتریایی یا قارچی ممکن است نیاز به دارو داشته باشد.

درمان پزشکی

اگر باکتری عامل ذات الریه باشد، پزشک آنتی بیوتیک تجویز خواهد کرد. بیشتر افراد پس از شروع آنتی بیوتیک ها طی سه تا پنج روز احساس بهتری دارند.

مهم است که شما تمام دوره آنتی بیوتیک خود را تمام کنید تا از بازگشت عفونت جلوگیری کنید و مطمئن شوید که عفونت به طور کامل پاک شده است.

در موارد عفونت ویروسی مانند آنفولانزا، پزشک شما ممکن است داروهای ضد ویروس را برای کمک به کاهش طول بیماری و شدت علائم شما تجویز کند.

درمان در بیمارستان ممکن است شامل آنتی بیوتیک و مایعات داخل وریدی (IV) باشد. اگر میزان اکسیژن خون شما پایین باشد، ممکن است اکسیژن درمانی دریافت کنید تا به حالت عادی برگردد.

درمان در نوزادان و کودکان

اگر کودک شما عفونت باکتریایی دارد، پزشک آنتی بیوتیک تجویز می کند. مراقبت در منزل برای کاهش علائم نیز گام مهمی در مدیریت این بیماری است. اطمینان حاصل کنید که کودک شما به اندازه کافی مایعات دریافت می کند و استراحت خوبی دارد.

نحوه جلوگیری از برونکوپنومونی

اقدامات مراقبتی ساده می تواند خطر ابتلا به بیماری را کاهش دهد. روش صحیح شستن دست ها را همیشه رعایت کنید.

واکسیناسیون می تواند به جلوگیری از انواع خاصی از ذات الریه کمک کند. حتماً سالانه واکسن آنفولانزا دریافت کنید زیرا آنفولانزا می تواند باعث ذات الریه شود. انواع متداول پنومونی باکتریایی با واکسن پنوموکوکی قابل پیشگیری است. این واکسن ها هم برای بزرگسالان و هم برای کودکان در دسترس هستند.

جهت پاسخگویی به سوالات مربوط به این بیماری با شماره تلفن زیر تماس

حاصل فرمایید تلفن: ۰۲۸۳۵۲۲۵۱۲۰ الی ۲۸

واحد آموزش سلامت

جهت اطلاعات تکمیلی به سایت ذیل مراجعه نمایید:

