

آموزش به بیمار

مراقبت از شالون



تهیه کننده: فاطمه منسوبی
کارشناس پرستاری
تائید کننده مطالب: دکتر مسکربور
متخصص داخلی

- پس از اتمام دیالیز و شسته شدن شاخه های کاتتر به وسیله سرم و سپس هپارینه می شود .
- با روش استریل محل کاتتر را ضد عفونی کنید .

جهت پاسخگویی به سوالات مربوط به این بیماری با شماره تلفن زیر تماس حاصل فرمایید

تلفن: 35225120 الی 28


واحد آموزش سلامت

جهت اطلاعات تکمیلی به سایت ذیل مراجعه نمایید:

Vlayathose.semums.ac.ir

منابع: راهنمای آموزش به بیمار منیژه نصیری زاده

- در صورت جابجایی ، کاتتر را به هیچ عنوان به جلو یا عقب حرکت ندهید .



- از گذراندن کلامپ بر روی شاخه کاتتر خودداری کنید .

- علایمی مثل آمفیزم جلدی ، اختلالات تنفسی و هماتوم را مد نظر داشته و پزشک را مطلع کنید .

چگونگی مراقبت از کاتتر ورید مرکزی :

- از روش استریل در به کار گیری کاتتر ها جهت پیشگیری از عفونت استفاده کنید .
- زمان و طول مدت استفاده از کاتتر را به حداقل برسانید (دو هفته پس از کاتترگذاری احتمال عفونت 8 درصد , یک ماه بعد 25 درصد و دو ماه بعد این مقدار دو برابر می شود).
- محل ورود کاتتر را از نظر تورم , خونریزی و ترشح کنترل کنید .
- از ایجاد کشش و یا وارد آمدن ضربه بخصوص به هنگام دیالیز خودداری کنید .
- از کاتتر جهت نمونه گیری و انفوزیون سرم استفاده نکنید .

از عوارض آنی این روش , پارگی شریان , آمبولی , پنوموتوراکس , هموتوراکس , خونریزی , تامپوناد و پریکاردیال افیوژن را می توان ذکر کرد .

عوارض تاخیری شامل عفونت , ترومبوز , تنگی عروق فیستول شریانی می باشد .

عفونت:

عفونت یکی از شایعترین عوارض کاتتر بوده و از جمله عللی است که سبب خارج کردن کاتتر و افزایش میزان بستری و مرگ و میر در این بیماران می گردد . شالدون تا 6 هفته قابل استفاده است اما معمولا به دلیل عفونت باید هر 3 تا 4 هفته یکبار تعویض گردد.



برای انجام همودیالیز دسترسی به عروق با جریان خون فراوان

ضروری است در موارد اضطراری و نیاز به دسترسی موقت

معمولا از طریق قرار دادن یک کاتتر در یک ورید بزرگ مثل

ژوگولار داخلی و یا ساب کلاوین از طریق پوست انجام می شود.

حال آنکه بیماران با نارسایی مزمن کلیه نیاز به دسترسی عروقی

دائمی دارند.

کاتتر وریدی مرکزی – شالدون

شایعترین دسترسی عروقی موقت در درمان حاد و موقت

بیماران استفاده از روش قرار دادن کاتتر ورید مرکزی

است .

در این شرایط کاتتر را در ورید زیر ترقوه ژوگولار و

یا ورید رانی قرار می دهند.