



دانشگاه علوم پزشکی سمنان
مرکز آموزشی، پژوهشی درمانی و لایت
واحد آموزش سلامت

سرطان سینه


علائم و راه های تشخیص



تهیه کننده: فاطمه کبیریان راد کارشنای ارشد آموزش پزشکی
تأیید کننده: دکتر معصومه مسعودیان متخصص انکولوژی

شماره سند: EL- ۸۸-۰۹
تاریخ صدور: ۱۴۰۴/۱۱/۱۵
تاریخ بازنگری: ۱۴۰۵/۱۱/۱۵

نشانه های سرطان سینه چیست؟



درمان سرطان پستان:

جراحی
شیمی درمانی
پرتودرمانی
هورمون تراپی
ایمونوتراپی

منبع: درسنامه برونر و سودارت

۵. تغییر اندازه پستان:

گاهی اوقات به علت بزرگی بیش از حد یک تومور و یا التهاب قابل توجه دور تومورهای کوچکتر، پستان در یک طرف، بطور واضحی بزرگتر از طرف مقابل میشود.

۶. تغییرات نوک پستان:

در سرطان، این فرورفتگی حالت ثابت دارد و با معاینه دقیق پستان ممکن است وجود غده ای در زیر نوک و هاله پستان مشخص شود.

آزمایش های تشخیصی:

ماموگرافی
سونوگرافی
ام آر آی (MRI)
نمونه برداری (بیوپسی)
تست های آزمایشگاهی برای تشخیص
سرطان پستان

سرطان سینه چیست؟

سرطان سینه بیماری است که در آن سلول های سینه بدون کنترل رشد می کنند. سرطان سینه انواع مختلفی دارد. نوع سرطان سینه بستگی به این دارد که کدام سلول در سینه به سرطان تبدیل شود.

دلایل ابتلا به سرطان سینه؟

- سابقه سرطان پستان در خود فرد
- سابقه خانودگی سرطان پستان
- سن اولین زایمان بیشتر از ۳۵ سال
- بلوغ زودرس و یائسگی دیررس
- نازایی
- کهولت سن
- مصرف طولانی مدت قرص های ضدبارداری و هورمونی
- سیگار و الکل

علائم و نشانه های سرطان پستان چیست؟

۱. توده یا تومور پستان:

توده های مشکوک به سرطان در لمس به صورت سفت یا سخت، گاه غیر متحرک و با چسبندگی به اطراف لمس میشود.

۲. ترشح از نوک پستان:

ترشحات پستان می توانند به رنگ های مختلف مشاهده شوند. ترشح ناشی از سرطان پستان معمولا خون واضح و یا خونا به ای، یا در برخی از موارد بی رنگ می باشد.



۳. تغییرات پوست پستان:

این تغییرات بصورت فرورفتگی و یا کشیدگی پوست پستان بروز می کند. فرورفتگی پوست پستان ممکن است بصورت ثابت و مشخص وجود داشته باشد و یا در حالات خاصی از معاینات پستان دیده شود.

کشیدگی پوست، اگرچه علامتی مهم است ولی یافته قطعی دال بر سرطان نیست و گاهی به دنبال بیماری های خوش خیم پستان نیز دیده می شود.

۴. بزرگی غدد لنفاوی زیر بغل:

بزرگی غدد لنفاوی زیربغل می تواند به دلیل ضایعات خوش خیم و حتی التهاب ها و ضربه به ناحیه دست و یا پستان باشد. بنابراین اگرچه این علامت بیمار را به سمت بررسی های بیشتر هدایت می کند ولی باید دانست که این حالت از ابتدا نگران کننده نیست.